# ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЗА

THE FREQUENCY OF ALCOHOL PSYCHOSIS IN DIFFERENT AGE GROUPS IN MEN AND WOMEN, AND THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION OF PSYCHOSIS

**УДК 61**

**Курбанова Виктория Владимировна,**
резидент кафедры неврологии, нейрохирургии, психиатрии и реабилитологии, Карагандинский медицинский университет

**Цацко Наталья Андреевна,**
резидент кафедры неврологии, нейрохирургии, психиатрии и реабилитологии, Карагандинский медицинский университет

**Кабакова Салтанат Молдагалимовна,**
резидент кафедры неврологии, нейрохирургии, психиатрии и реабилитологии, Карагандинский медицинский университет

**Василина Дарья Александровна,**
резидент кафедры неврологии, нейрохирургии, психиатрии и реабилитологии, Карагандинский медицинский университет

**Kurbanova V.V.**
Resident of the Department of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry and Rehabilitation, Karaganda Medical University, vika_bodraya@mail.ru

**Tsatsko N. A**

Resident of the Department of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry and Rehabilitation, Karaganda Medical University, miss.tsatsko@mail.ru

**Kabakova S.M.**

Resident of the Department of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry and Rehabilitation, Karaganda Medical University, sal_kab@mail.ru

**Vassilina D.A**

Resident of the Department of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry and Rehabilitation, Karaganda Medical University, poltorak@kgmu.kz

## АННОТАЦИЯ

Целью исследования является оценка частоты встречаемости алкогольных психозов в разных возрастных группах и влияние социальных факторов на формирование психоза. В качестве метода исследования применялся опросный лист, включавший в себя вопросы о поле, возрасте, семейном положении, наличию постоянного места работы и уровня образования. Опрашиваемые были разбиты на две возрастные группы: 25 - 44 лет и 45 - 60 лет. Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной группе от 25 до 44 лет выше у женщин. Частота встречаемости алкогольных психозов в возрасте от 45 до 60 лет преобладает среди мужчин.

## ANNOTATION

The aim of the study is to assess the frequency of alcohol psychosis in different age groups and the influence of social factors on the formation of psychosis. As a research method, a questionnaire was used that included questions about gender, age, marital status, availability of a permanent job and level of education. The respondents were divided into two age groups: 25 - 44 years old and 45 - 60 years old. The incidence of alcoholic psychosis in the age group from 25 to 44 years

is higher in women. The incidence of alcoholic psychosis at the age of 45 to 60 years prevails among men.

**Ключевые слова:** алкоголизм, алкогольный психоз, женщины, мужчины, частота встречаемости.

**Keywords**: alcoholism, alcoholic psychosis, women, men, frequency of occurrence.

**Актуальность.**

В соответствии с критериями ВОЗ, алкоголизм – хроническое психическое заболевание, характеризующееся синдромом наркоманической зависимости от алкоголя, то есть совокупностью симптомов, вызывающихся чрезмерным потреблением алкоголя, в результате которого наступают специфические психические, соматические и неврологические расстройства, а также социальные конфликты.

Алкоголь– наиболее часто используемое психоактивное вещество. Алкогольсодержащие напитки с позиции фармакологии, токсикологии и наркологии – наркотическое вещество. Но так как алкоголь не внесен в список веществ, взятых под контроль, как наркотики, юридически алкоголизм не считается наркоманией. [1]

Алкогольные психозы – это группа психических расстройств, которые могут быть кратковременными, острыми и иметь продолжительное хроническое течение. Протекают в форме экзогенных, эндоформных и психоорганических расстройств, возникающих во второй и третьей стадии алкоголизма. Психозы иногда развиваются в период усиленного употребления алкоголя, но чаще всего они возникают в период абстиненции. По данным ВОЗ, алкогольные психозы возникают у 10% лиц, страдающих алкоголизмом.[2]

Изучение алкогольных психозов актуально в связи с их патоморфозом, а также в связи с тем, что частота возникновения алкогольных психотических состояний отражает уровень алкоголизации населения [3]

**Цель исследования:** оценить частоту встречаемости алкогольных психозов в разных возрастных группах и влияние социальных факторов на формирование психоза.

**Дизайн исследования:** поперечное открытое исследование.

**Материалы и методы:** В исследование были включены дееспособные пациенты Карагандинского областного психоневрологического диспансера в возрасте от 18 до 75 лет, не имеющие хронической соматической патологии с верифицированным диагнозом «Алкогольный психоз». Все участники исследования подписали информированное согласие перед началом анкетирования.

Критерии исключения:

- возраст менее 18 и более 65 лет;
- наличие хронической соматической патологии;
- беременность;
- наличие других психических расстройств.

Для определения частоты встречаемости алкогольных психозов нами был разработан опросник, который включает в себя: пол, возраст, данные о семейном положении, наличии постоянного места работы и уровне образования.

**Результаты и их обсуждения.**

В исследовании участвовали 100 пациентов: 50 мужчин и 50 женщин. Самому молодому участнику исследования среди мужчин было 25 лет, а самому старшему – 67, среди женщин самой молодой участнице было 27, самой старшей 63.



Диаграмма 1. Частота встречаемости алкогольных психозов у женщин в возрасте 25-44 лет.

Встречаемость алкогольных психозов у женщин в молодом возрасте (25-44 лет) составляет 40% из всех поступивших женщин в 2018-2019 году.




Диаграмма 2. Трудоустройство женщин в возрасте 25-44 лет.

Из этих женщин постоянное место работы имеют 6% женщин.




Диаграмма 3. Семейное положение женщин в возрасте 25-44 лет.

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 16% молодых женщин.




Диаграмма 4. Наличие высшего/средне-специального образования среди женщин 25-44 лет.

Среди женщин молодого возраста высшее образование имеется у 8%.




Диаграмма 5. Частота встречаемости алкогольных психозов у мужчин в возрасте 25-44 лет.

Среди молодых мужчин, поступивших в 2018-2019году, алкогольный психоз встречается в 30% случаев




.

Диаграмма 6. Трудоустройство мужчин в возрасте 25-44 лет.

Среди них постоянное место работы имеют 22% мужчин.




Диаграмма 7. Семейное положение мужчин в возрасте 25-44 лет.

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 14% поступивших с алкогольным психозом в 2018-2019 году.




Диаграмма 8. Наличие высшего/средне-специального образования среди мужчин 25-44 лет.

Высшее/средне-специальное образование имеют 22% мужчин.




Диаграмма 9. Частота встречаемости алкогольных психозов усреди женщин в возрасте 25-44 лет.

Встречаемость алкогольных психозов у женщин в зрелом возрасте (45-60 лет) составляет 48% из всех поступивших женщин в 2018-2019 году.




Диаграмма 10. Трудоустройство женщин в возрасте 45-60 лет.

Из этих женщин постоянное место работы имеют 6% женщин.




Диаграмма 11. Семейное положение женщин в озрасте 45-60 лет.

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 20% зрелых женщин.




Диаграмма 12. Наличие высшего/средне-специального образования среди женщин в возрасте 45-60 лет.

Высшее образование имеют 16% женщин зрелого возраста.

Таким образом среди женщин зрелого возраста, поступивших в 2018-2019 году, не устроенная личная жизнь/ низкий уровень образованности женщин / отсутствие постоянного места работы оказывает высокое влияние на злоупотребление алкоголем женщинами и формирование, в дальнейшем, алкогольных психозов.




13. Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди мужчин в возрасте 45-60 лет»

Среди зрелых мужчин, поступивших в 2018-2019году, алкогольный психоз встречается в 56% случаев




14. Диаграмма: «Трудоустройство мужчин в возрасте 45-60 лет»

Среди них постоянное место работы имеют 10 % мужчин.



15. Диаграмма: «Семейное положение мужчин в возрасте 45-60лет.

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 30% поступивших с алкогольным психозом в 2018-2019 году.




16.Диаграмма:« Наличие высшего/средне-специального образования среди мужчин в возрасте 45-60 лет»

Высшее/средне-специальное образование имеют 24 % мужчин.




17 Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди женщин в возрасте 61-75 лет.»

В результате исследования мы выявили, что встречаемость алкогольных психозов у женщин в пожилом возрасте (61-75 лет) составляет 10% из всех поступивших женщин в 2018-2019 году




18 Диаграмма: «Трудоустройство женщин в возрасте 61-75 лет»

Из них только 2 % женщин имеют постоянное место работы.




19 Диаграмма: «Семейное положение женщин в возрасте 61-75 лет»

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 4% женщин.




20 Диаграмма: «Наличие высшего/средне- специального образования у женщин в возрасте 61-75 лет»

Высшее образование имеют 2% женщин молодого возраста.




21 Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди мужчин в возрасте 61-75 лет.

Среди пожилых мужчин, которые поступили в период с 2018 по 2019год, алкогольный психоз встречается в 16% случаев.

В данной возрастной группе мужчины не состоят в законном браке или нет долгосрочных отношений, так же 100% являются пенсионерами.




22 Диаграмма: «Наличие высшего/средне- специального образования у мужчин в возрасте 61-75 лет»

Имеют высшее/средне-специальное образование лишь 2% мужчин.

**Вывод:**

**1.** Среди женщин молодого возраста, поступивших в 2018-2019 году, отсутствие семьи оказывает высокое влияние на злоупотребление алкоголем женщинами и формирование, в дальнейшем, алкогольных психозов.

**2.** Среди мужчин пожилого возраста, которые поступили в период с 2018го по 2019 год, значительное влияние на злоупотребление алкоголем и

формирование психоза оказывает отсутствие семьи и постоянного места работы

**3.** Среди молодых мужчин, поступивших в 2018-2019 году равносильное влияние на формирование алкогольных психозов, оказывают отсутствие высшего образования и отсутствие постоянного места работы.

**4.** Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной группе от 25 до 44 лет у женщин составляет 40%, что на 10% превышает частоту алкогольных психозов у мужчин этой же возрастной группы.

**5.** Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной группе от 45 до 60 лет у женщин составляет 48 %, что на 8 % меньше алкогольных психозов у мужчин этой же возрастной группы.

**6.** По результатам исследования чаще всего алкогольные психозы встречаются в возрасте от 45 до 60 лет, процент мужчин в этой возрастной группе составляет 56%, среди женщин 48%. Было отмечено, что в данной возрастной группе влияние на злоупотребление алкоголем оказывает отсутствие семьи, в данной группе процент респондентов без семьи составляет 50%.

**Литература:**

1. Понятие ПАВ. Алкоголизм (Н.Л. Скворцов) – кафедра психиатрии и наркологии 1СПбГМУ им. И.П. Павлова [Электронный ресурс] – URL: https://alkodd.ru/kodirovanie/ponyatie-pav-alkogolizm-n-l-skvortsov-kafedra-psihiatrii-i-narkologii-1spbgmu-im-i-p-pavlova.html

2. Ржевская, Н.К., Куташов В.А. Клиника и диагностика алкогольных психозов // Центральный научный вестник. - 2016. - № 13. - С. 31-34

3. Гофман А.Г., Орлова М. А., Меликсетян А. С. Алкогольные психозы: клиника, классификация // Социальная и клиническая психиатрия. 2010. №1. С. 5-12.

4. Психиатрия и наркология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, В. В. Чирко, М. А. Кинкулькина. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2012. – 832 с.

5. Гофман А.Г. Клиническая наркология. - М. : Миклош, 2003 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). - 214 с.

6. Вербина Г.Г. Гендерные особенности целостного здоровья человека // International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Том 2. №3. С. 188 – 190.

7. Цахаева А.А., Аминова Д.К. Психологическое исследование подростков с различным уровнем организации правового самосознания // International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Том 2. №3. С. 201 – 206.

8. Шатохин А.А. Системный подход в анализе и диагностике эффективности управления профессиональной отраслевой идентификацией личности // International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Том 2. №2. С. 39 – 46.

**Literature**

1. The concept of surfactants. Alcoholism (N. L. Skvortsov) - Department of psychiatry and narcology 1spbsmu named after I. p. Pavlov [Electronic resource] - URL: https://alkodd.ru/kodirovanie/ponyatie-pav-alkogolizm-n-l-skvortsov-kafedra-psihiatrii-i-narkologii-1spbgmu-im-i-p-pavlova.html

2. Rzhevskaya, N. K., Kutashov V. A. Clinic and diagnostics of alcoholic psychoses / / Central scientific Bulletin, 2016, no. 13, Pp. 31-34

3. Hoffman A. G., Orlova M. A., Meliksetyan A. S. Alcoholic psychoses: clinic, classification / / Social and clinical psychiatry. 2010. no. 1. Pp. 5-12.

4. Psychiatry and narcology : textbook / N. N. Ivanets, Yu. G. Tulpin, V. V. Chirko, M. A. Kinkulkina. - Moscow: GEOTAR Media, 2012. - 832 p.

5. Hoffman A. G. Clinical narcology. - M.: Miklosh, 2003 (GUP Smol. obl. tip. im. V. I. Smirnov). - 214 p.

6. Verbina G. G. Gender features of holistic human health / / International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Volume 2. No. 3. Pp. 188-190.

7. Tsakhaeva A. A., Aminova D. K. Psychological research of teenagers with different levels of organization of legal self-consciousness / / International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Volume 2. No. 3. Pp. 201-206.

8. Shatokhin A. A. System approach in the analysis and diagnostics of the effectiveness of management of professional industry identity / / International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Volume 2. No. 2. Pp. 39-46.